

Инструкция к антителу мышинному моноклональному к цитокератину широкого спектра, Mouse anti cytokeratin, wide spectrum

Каталожный номер:	Mob 120
Иммуноген:	Цитокератины, выделенные из человеческого эпидермального стратум корнеум.
Клон:	DBS/1.1
Изотип:	IgG1, kappa
Форма выпуска:	Это антитело поставляется в виде очищенной фракции иммуноглобулина с азидом натрия в качестве стабилизатора
Титр/Рабочее разведение:	Это антитело может быть разведено до титра 1:25-1:75 при использовании методики ABC. Однако, в зависимости от условий окрашивания мы предлагаем конечному пользователю самому определить окончательное разведение.
Протокол окраски:	Мы предлагаем инкубационный период в течение 30 минут при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации определяются пользователем. <u>Требуется протеолитическая обработка формалин/парафиновых срезов перед иммуноокрашиванием.</u>
Специфичность:	Это антитело разработано для широкого скрининга цитокератинов. Оно окрашивает карциномы в лимфоузлах и костном мозге. Оно реагирует с полипептидами цитокератина 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17 и 18 при иммуноблоттных анализах.
Положительный контроль:	Кожа
Клеточная локализация:	Цитоплазма
Хранение:	Хранить при температуре 2-8 ⁰ c. Не использовать по истечении срока годности, указанного на этикетке.
Литература:	i) Angus et al. J Pathol 155: 71, 1988. ii) Gatter et al. J Clin Pathol 35: 1253, 1982. iii) Gosh et al. British J Hematol 153: 377, 1987. iv) Moll et al. Cell 31: 11, 1982. v) Takahashi et al. Path Res Pract 187: 145, 1991

DBS will not be held responsible for patent infringement or other violation that may occur with the use of our product.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Tel: 925 484 3350, Fax: 925 484 3390

Website: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com