

# Инструкция к антителам кроличьим полклональным к альфа-1- антихимотрипсину, Rabbit anti Alpha-1-Antichymotrypsin

<b>Номер по каталогу:</b>	RP 047
<b>Иммуноген:</b>	Альфа-1-антихимотрипсин, выделенный из человеческой сыворотки.
<b>Организм-носитель:</b>	Кролик
<b>Формат:</b>	Очищенная фракция иммуноглобулина кроличьей антисыворотки против альфа-1-антихимотрипсина, содержащая азид натрия в качестве консерванта.
<b>Титр/рабочее разведение:</b>	Это антитело может быть разведено до титра 1:25-1:50 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.
<b>Протокол окраски:</b>	Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Пригодно для тканей, обработанных формалином/парафином.</u>
<b>Специфичность:</b>	Антитело специфично к человеческому альфа-1-антихимотрипсину. Это антитело окрашивает моноциты и макрофаги в человеческих тканях и не окрашивает клетки какого-либо иного типа. Это антитело демонстрирует перекрестную реактивность с широким спектром видов млекопитающих.
<b>Положительный контроль:</b>	Миндалины
<b>Локализация в клетке:</b>	Цитоплазматическая
<b>Хранение:</b>	Храните антитело при 2-8 <sup>0</sup> C. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.
<b>Библиография:</b>	1. Meis et al. Am J Clin Pathol 86: 591, 1986. 2. Nathrath et al. Acta Histochem 25: 69, 1982.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

**DBS**

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: [www.dbiosys.com](http://www.dbiosys.com) e-mail: [customersupport@dbiosys.com](mailto:customersupport@dbiosys.com)