

Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к лизоциму (мурамидазе), Rabbit anti Lysozyme (Muramidase)

Номер по каталогу:	RP 028
Иммуноген:	Лизоцим, выделенный из мочи больных с моноцитарной лейкемией.
Организм-носитель:	Кролик
Формат:	Очищенная фракция иммуноглобулина кроличьей антисыворотки против человеческого лизоцима, содержащая азид натрия в качестве консерванта.
Титр/рабочее разведение:	Это антитело может быть разведено до титра 1:50-1:1000 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.
Протокол окраски:	Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Пригодно для тканей, обработанных формалином/парафином.</u>
Специфичность:	Это антитело реагирует с лизоцимом. Оно окрашивает гранулоциты, моноциты и макрофаги в человеческих миндалинах, коже и толстой кишке. Это антитело не вступает в перекрестную реакцию с какими-либо иными типами клеток.
Положительный контроль:	Миндалина
Локализация в клетке:	Цитоплазматическая
Хранение:	Храните антитело при 2-8 ⁰ C. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.
Библиография:	i) Morsky et al. Clin Chim Acta 178: 327, 1988. ii) Krugliak et al. Am J Hematol 21: 99, 1986.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com