

Инструкция к антителам кроличьим поликлональным к рецептору соматостатина, Rabbit anti somatostatin receptor

Номер по каталогу:	RP 081
Иммуноген:	Синтетический пептид С-конца соматостатина крысы.
Организм-носитель:	Кролик
Формат:	Очищенная фракция иммуноглобулина из антисыворотки кролика к соматостатину человека, содержащая азид натрия в качестве консерванта.
Титр/рабочее разведение:	Это антитело может быть разведено до титра 1:50-1:75 в методе авидин-биотинового комплекса. Однако, в зависимости от используемых условий окраски, мы рекомендуем, чтобы окончательное разведение определялось пользователем.
Протокол окраски:	Мы рекомендуем 30-минутный инкубационный период при комнатной температуре. Однако, в зависимости от условий фиксации и используемой системы окраски, оптимальные условия инкубации следует определять пользователю. <u>Срезы тканей, фиксированные формалином и залитые в парафин, перед окраской с использованием иммунной метки требуют демаскировки антигена при высокой температуре с 10 ммоль цитратного буфера при pH 6,0.</u>
Специфичность:	Это антитело реагирует с белком массой 60 кДа. Белки семейства рецепторов соматостатина взаимодействуют с белком G и вовлечены в регуляцию различных процессов, включая секрецию инсулина, глюкагонов и гормона роста и возбуждение нейронов нервной системы. Кросс-реакция с мышью и крысой.
Положительный контроль:	Поджелудочная железа
Локализация в клетке:	Цитоплазма
Хранение:	Храните антитело при 2-8 ⁰ C. Не используйте его по истечении срока годности, указанного на ярлыке.

Компания DBS не несет ответственность за нарушение патентного права или другие нарушения, которые могут иметь место в процессе применения данного препарата.

DBS

1020 Serpentine Lane, # 114, Pleasanton, CA 94566 Тел.: 925 484 3350, Факс: 925 484 3390

Веб-сайт: www.dbiosys.com e-mail: customersupport@dbiosys.com